Дети-пассивные курильщики

• Пассивное или активное курение во время беременности может привести к ее прерыванию или появлению серьезных нарушений внутриутробного развития ребенка;

• на 28% повышается риск мертворождения и смертности новорожденных;

• риск рождения ребенка с низким весом в два раза больше, чем у некурящих;

• происходит недостаточное образование молока;

У детей-пассивных курильщиков существенно снижается иммунитет.

Они чаще:

• болеют респираторными заболеваниями;

• страдают заболеваниями среднего уха;

• страдают хроническими бронхитами;

Курение одного и, особенно, обоих родителей увеличивает в несколько раз вероятность курения ребенка в будущем.

2015 – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОД БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Желаем Вам здоровья!

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АМИ

Российское агентство медико-социальной информации АМИ
для Министерства здравоохранения Российской Федерации

КАК оградить ребенка от вредных привычек?

ГНИЦ профилактической медицины

Материал разработан
ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины»
Минздрава России